

Hymenoptera Nikita Kokujev (Jaroslavl).
Duo Hemiptera nova faunae turanicae a J. V. Vasiljev
collecta.

Никита Кокуевъ (Ярославль).
Два новыхъ туранскихъ перепончатокрылыхъ по материаламъ
И. В. Васильева.

1. *Hemitelus vasiljevi*, sp. n.

♂. Capite, thorace, abdominis segmentis 1-o 2-o que (petioli basi nigra excepta) pedibusque maxima ex parte fulvis, stemmatico infuscato, abdominis segmentis 3-o et sequentibus nigris, femoribus tibiisque intermediis supra, posticis fere totis infuscatis, tibiis omnibus basi albidis, tegulis albis, alis hyalinis parum distincte fasciatis, stigmate fusco, basi albo.

Capite, thorace abdomeque tenuiter punctulatis, parum nitidis, mesopleuris nitidioribus. Capite pone oculos rotundato, genis subbuccatis, facie antennas versus distincte angustata, ocellis majusculis. Metathoracis area superomedia sat terminata, subimpressa, nitidula. Abdomine longo, segmento 1-o elongato et angusto, apicem versus vix dilatato, petiolo carinato, postpetiolo subaciculato; segmento 2-o etiam elongato apice quam basi parum latiore, latitudine sua apicali longiore; 3-o 2-o distincte breviore sed vix transverso; segmento 4-o distincte transverso; valvulis genitalibus exsertis, validis. Pedum calcaribus brevibus. ♀ ignota. Long. 3,5 mm.

Turkestania.

1 ♂ полученъ И. В. Васильевымъ изъ чехлика *Coleophora*.
Туркестанъ.

2. *Hemitelus transcaspicus*, sp. n.

♀. Corpore, palpis, antennis pedibusque fulvis, solum abdome apicem versus tibiisque posticis subinfuscatis, his basi albidis, ungu-

culis nigris; alis hyalinis, fasciis 2 fuscis ornatis, fascia sub stigmate posita latissima, cellula radiali infuscata puncto hyalino notata, stigmate fusco, basi albo, tegulis albidis.

Capite subopaco, tenuiter punctulato, sat magno, vertice lato pone oculos rotundato, genis buccatis, clypeo mutico a facie vix discreto, facie medio parum convexa, fronte plana. Antennis haud longis, sat tenuibus, apicem versus parum incrassatis, summo apice attenuatis, scapo subgloboso, exciso. Thorace supra subopaco, tenuiter punctulato, scutello mesopleurisque minus punctulatis, magis nitidis; metanoto imperfecte areolato, area superomedia utriusque vix terminata, hujus angulis anterioribus parum sed distinete prominulis. Alarum superiorum cellula radiali brevi, areola regulari sed antice aperta, angulo infero cellulae discoidalis acuto; alarum posteriorum nervello antefurcali. Abdomine basi (segmentis 1-o—3-o) tenuiter punctulato, segmentis reliquis magis nitidis, minus distinete punctulatis, segmento 1-o haud carinato, spiraculis parum prominulis, terebra dimidii abdominalis longitudine. Pedum calcaribus brevibus. ♂ ignotus. Long. 3,5 mm.

Turkestania.

♀ получена И. В. Васильевым изъ чехлика *Coleophora*.
Туркестанъ.